



LÍNEA NUTRIFER EN EL CULTIVO DE AJÍ Y TOMATE

La diversidad de formas de crecimiento, variedades, formas de conducción, destino de los productos, solo permiten dar recomendaciones generales. Los aspectos no contemplados, pueden consultarse en nuestro departamento técnico.

Lo enunciado es válido para ají y tomate salvo que se aclare específicamente.

Característica de nuestros productos: Toda la línea de foliares están formulados con extracto de algas, que contienen más de 30 hormonas naturales. Este paquete hormonal permite usarlo para la corrección de los desequilibrios, que se presentan durante el ciclo.

No altera las etapas fenológicas. Aplicados en prefloración, incrementara el número de flores, sin modificar su duración.

Cuando se pase junto a insecticidas, funguicidas o herbicidas aumentara el efecto de estos, por su efecto de coadyuvante y carrier en productos sistémicos. En tanto se respeten las dosis máximas del producto acompañante no hay riesgo de fototoxicidad.

Momento o situación	Producto	Dosis	Forma de aplicación	Efecto
Siembra del almacigo	N. Bioactivor	10 ml/kg	sobre la semilla	Mejora EG y PG
Semana previa trasplante	N. Complejo Plus	20 ml/l	Foliar	Evita estrés
Trasplante	N. Complejo Plus	20 ml/l	Foliar	Arraigüe inicial
15-30 y 45 días del trasplante	N. Complejo Plus	3 l/ha	Foliar o fertirriego	Lograr desarrollo in.
Baja irradiancia	N. Bioactivor	1 l/ha	Foliar o fertirriego	Aumenta concentración de sólidos
Altas temperaturas	N. Bioactivor	1 l/ha	Foliar o fertirriego	Aumenta concentración de sólidos
9 a 15 días de antesis	N. Bioactivor	1 l/ha	Foliar o fertirriego	Aumenta concentración de sólidos
Menos de 5 grados	N. Bioactivor	1 l/ha	Foliar o fertirriego	Aumenta concentración de sólidos
Más de 37 grados	N. Bioactivor	1 l/ha	Foliar o fertirriego	Aumenta concentración de sólidos
Falta de calcio	N. Calcio	2 l/ha	Foliar o fertirriego	Corrección Ca
Falta de potasio	N. Potasio	2 l/ha	Foliar o fertirriego	Corrección K
15 días antes de cosecha	N. Complejo Plus	2 l/ha	Foliar o fertirriego	Conservación fruto
Abscisión de flores	N. Bioactivor	2 l/ha	Foliar o fertirriego	Antiestrés

Por fertirriego debe aplicarse una dosis doble que la foliar.